

開始時 患者 状況	様	生年 月日	M S T	年	月	日	再受診の目安： PSAが 1.0 ng/ml 以上に上昇したら、がんセンターを再受診				
	パス開始日	年	月	日	生検日	年	月	日	治療開始前PSA	ng/ml	グリソンスコア
					生検結果	stage	パス開始時PSA	ng/ml			
	がんセンター パス開始 (/)	1回目 (/)	2回目 (/)	3回目 (/)	4回目 (/)	5回目 (/)	6回目 (/)	7回目 (/)	8回目 (/)	9回目 (/)	10回目 (/)
目標	◇PSA値が1.0ng/ml以下で経過する。 ◇継続不能な副作用の出現がなく経過する。										
検査	がんセンターパス開始 最終検査日 月 日 PSA値 ng/ml	 <p>PSA 血液検査 尿検査</p> <p>◎経過観察の目安は PSAの上昇がない場合：3ヶ月ごとです。</p> 									
注射 ・ お薬	処方薬 () () ()	使用薬剤名 ()	使用薬剤名 ()	使用薬剤名 ()	使用薬剤名 ()	使用薬剤名 ()	使用薬剤名 ()	使用薬剤名 ()	使用薬剤名 ()	使用薬剤名 ()	使用薬剤名 ()
お体の 調子	排尿異常の有無 有・無 副作用症状の有無 有・無	排尿異常の有無 有・無 副作用症状の有無 有・無	排尿異常の有無 有・無 副作用症状の有無 有・無	排尿異常の有無 有・無 副作用症状の有無 有・無	排尿異常の有無 有・無 副作用症状の有無 有・無	排尿異常の有無 有・無 副作用症状の有無 有・無	排尿異常の有無 有・無 副作用症状の有無 有・無	排尿異常の有無 有・無 副作用症状の有無 有・無	排尿異常の有無 有・無 副作用症状の有無 有・無	排尿異常の有無 有・無 副作用症状の有無 有・無	排尿異常の有無 有・無 副作用症状の有無 有・無
その他	 <p>◎こんな症状があったら、診察時に教えてください</p> <p>①疾患からおこる症状：排尿障害（尿の出づらいつい感じ・頻尿）など ②ご自分で自覚できる副作用症状：ほてり感・乳房の腫脹・圧痛・湿疹など ③血液検査でみる副作用症状 肝機能異常：疲れやすくなったり 白血球数減少…感染に対する抵抗力が低下します。 血小板数減少…血が止まりにくくなり、出血しやすくなります。</p>										